




Symptomatologia – układ nerwowy

Anna Piwowarczyk



Ból głowy

Drgawki

Zaburzenia świadomości

Osłabienie/hipotonia

Opóźnienie rozwoju

Ataksja/zaburzenia chodu

Małogłowie/wielkogłowie

Objawy oponowe

A stylized, monochromatic illustration in shades of brown and tan. It depicts a family of four sitting around a rectangular table. On the left, a person is seated, leaning forward with their hands clasped. In the center, another person sits with their back to the viewer. On the right, a third person is seated, facing the viewer. A fourth person, possibly a child, is seated between the central and rightmost figures. The background is a solid dark brown color. The overall style is minimalist and graphic.

Wywiad

- Przebieg ciąży i porodu
- Kroki milowe (regres)
- Zaburzenia zachowania
- Choroby przewlekłe
- Leki
- Choroby w rodzinie
- Niepokoje rodziców

Ból głowy

- problem dotyczy ok. 80% dzieci
- ok. 20 % (4-18 rż) poważny lub częsty
- rzadko związane z poważnym organicznym problemem (np. guz mózgu, krwawienie)
- ok. 60 % pierwotne (migrena 11%, napięciowe 17%, klasterowe)
- jako przyczyna pilnej konsultacji - infekcja wirusowa/inf. górnych dróg oddechowych i migrena



Cechy sugerujące wtórny ból głowy

S - systemic symptoms

Y - years (patient age < 6 years)

**N - abnormal
neurologic signs**

O - acute onset



O - occipital signs

**P - precipitated by Valsalva,
positional,
progressive,
parents lack of a family history**



Ból głowy – objawy alarmujące

wiek < 5 lat

występowanie bólu wczesnie rano lub budzenie się z bólem głowy albo z wymiotami

nasilenie bólu głowy w trakcie wysiłku fizycznego

nagły początek

stale nasilający się ból głowy

choroby towarzyszące (np. białaczka w wywiadzie, SLE)

zmiana zachowania/osobowości

wybudzanie ze snu

obrzęk tarczy nerwu wzorkowego

nieprawidłowości w badaniu neurologicznym

Sheridan DC, 2017


Dao JM, 2018



Drgawki

Drgawki


- Ryzyko 3,6% min. 1 epizodu do 80 rż
- Dzieci: 67/100,000 (204/100,000 wśród niemowląt) - epizod drgawek nie gorączkowych
- Gorączkowe (3-5%)



Ataksja

min. 72 h

Upośledzenie koordynacji
ruchowej i równowagi



Typy ataksji

mózdkowa

czuciowa

przedsionkowa



**wynikająca z osłabienia siły
mięśniowej**

nieokreślona

