

Badanie przedmiotowe skóry, węzłów chłonnych, głowy i szyi

KLINIKA PEDIATRII Z ODDZIAŁEM OBSERWACYJNYM WUM

Badanie przedmiotowe

METODY:

1. Oglądanie
2. Badanie palpacyjne
3. Opukiwanie
4. Osłuchiwanie

SKÓRA

- Zabarwienie
- Wykwity
- Elastyczność
- Ucieplenie
- Wilgotność
- Przydatki skóry
- Obrzęki

CHOROBY I PIELEGNACJA SKÓRY

WYKWITY PIERWOTNE



Plama to wykwit leżący w poziomie skóry, niewyczuwalny przy dotyku i różniący się od otaczającej skóry zabarwieniem.



Grudka to wykwit wyniosły ponad poziom skóry, różniący się od skóry spoistością i ustępujący bez pozostawiania śladów.



Bąbel pokrzywkowy to wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry, który szybko powstaje i ustępuje bez śladów.



Guzek jest wykwitem, który związany jest ze zmianami w skórze właściwej; ustępuje pozostawiając blizny.



Pęcherzyk i pęcherz to wykwity wyniosłe ponad powierzchnię skóry, wypełnione płynem; ustępują nie pozostawiając blizny.



Krosta jest wykwitem wyniosłym ponad powierzchnię skóry, od początku wypełniony treścią ropną.

WYKWITY WTÓRNE



Łuska to złuszczaąca się warstwa rogowa skóry.



Strup powstaje w wyniku zasychania na powierzchni skóry płynu wysiękowego, krwi albo treści ropnej.



Nadżerka to ubytek naskórka powstający w wyniku jego zniszczenia. Przeczos to linijny ubytek w skórze uprzednio niezmienionej powstający najczęściej pod wpływem drapania.



Owrzodzenie to ubytek skóry właściwej, który ustępuje pozostawiając blizny.




Blizna powstaje w następstwie uszkodzenia skóry właściwej i zastąpienia jej tkanką łączną włóknistą.

WĘZŁY CHŁONNE

- Lokalizacja
- Liczba
- Wielkość
- Przesuwalność
- Bolesność
- Spoistość
- Wygląd skóry nad węzłami

LYMPH NODES AND THEIR LOCATIONS




GŁOWA - oglądanie

- ✓ kształt i wielkość głowy
 - pomiar obwodu głowy (przez największą wypukłość guzów czołowych i największą wypukłość potylicy)
- ✓ stosunek mózgoczaszki do twarzoczaszki
- ✓ symetria
- ✓ uwypuklenia lub wgłębienia w kościach czaszki
- ✓ wykwity na skórze
- ✓ blizny

GŁOWA - oglądanie

- Nieprawidłowości kształtu głowy:
 - spowodowane przedwczesnym zarastaniem szwów czaszkowych:
 - tódkogłowie
 - stożkogłowie
 - krótkogłowie
 - skośnogłowie
 - czaszka kwadratowa
 - małogłowie vs wielkogłowie
 - przedgłowie




GŁOWA – badanie palpacyjne

- Bolesność uciskowa
- Zmiany pourazowe
- Ubytki lub naddatki kości

GŁOWA – badanie palpacyjne

- Ciemiączka (przednie i tylne)
 - Wymiary
 - Napięcie
 - Wysklepienie względem poziomu kości czaszki
 - Tętnienie



Przednie zarasta zwykle między 9 a 18 mż (max do 24 mż), tylne zwykle do 6 tż, najpóźniej do 4 mż.

POWIEKI

- Opadanie
- Niemożność zamknięcia
- Zmarszczka nakątna
- Jęczmień vs gradówka

OCZY

- Osadzenie
 - Hipo- vs hiperteloryzm
 - Wytrzeszcz, zapadnięcie
- Ustawienie
 - Zez
 - Test Hirschberga
 - Cover Test
- Ruchomość gałek ocznych
- Oczopląs

SPOJÓWKI

- Barwa
- Powierzchnia
- Obecność wydzieliny

TWARDÓWKI

➤ Barwa

TECZÓWKI

➤ Barwa

➤ Kształt

ŻRENICE

➤ Kształt

➤ Szerokość

➤ Symetria


➤ Odruchy

NOS

- Kształt, osadzenie
- Drożność
- Skrzydełka nosa (ruchome/nieruchome)
- Błona śluzowa przewodów nosowych
- Obecność wydzieliny

USZY

- Małżowiny uszne
 - kształt
 - osadzenie
 - skóra
- Przewody słuchowe zewnętrzne
 - wydzielina
- Bolesność przy ucisku na skrawki uszne



CZERWIEŃ WARGOWA

- Kształt
- Barwa
- Wilgotność

PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ

- Barwa
- Wilgotność
- Wykwity

ZĘBY

- Liczba
- Wady zgryzu
- Ubytki, próchnica

JĘZYK

- Barwa
- Naloty
- Ruchomość
- Symetria

PODNIEBIENIE

- Twarde
 - Rozszczep
 - Podniebienie gotyckie
- Miękkie

MIGDAŁKI PODNIEBIENNE

- Wielkość
- Symetria
- Barwa
- Naloty

GARDŁO

- Barwa
- Naloty
- Wydzielina

SZYJA

- Kształt
- Osadzenie
- Symetria
- Ruchomość
- Tarczyca