


Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu moczowego



Jak postawić właściwą diagnozę?

- Wywiad (!)
- Badanie przedmiotowe
- Badania dodatkowe



Wywiad w chorobach układu moczowego

Należy zwrócić uwagę na:

- **Obecne dolegliwości** – przebieg, charakter, nasilenie
- **Zaburzenia mikcji** (nietrzymanie moczu, częste lub rzadkie mikcje, parcia naglące, nykturia)
- **Zaparcia, nietrzymanie stolca**
- Przebieg okresu płodowego i okołoporodowego – w tym **wyniki badań ultrasonograficznych (USG) w wywiadzie**, także wykonanych prenatalnie
- Wywiad dotyczący **przeszłości chorobowej** dziecka, w tym **zakażenia układu moczowego (ZUM) w wywiadzie**, rozpoznane wady układu moczowego
- Wywiad **rodzinny** (ZUM u rodziców, rodzeństwa, wady wrodzone układu moczowego w rodzinie)

Badanie przedmiotowe

- Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
- Występowanie obrzęków
- Nerki (objaw Goldflama)
- Pęcherz moczowy (opróżniony pęcherz jest fizjologicznie niewyczuwalny)
- Zewnętrzne narządy moczowo-płciowe



Badania dodatkowe

- Mocznik
- Kreatynina
- Ocena GFR (wskaźnik filtracji kłębuszkowej)
- Jony
- Badanie ogólne moczu
- USG układu moczowego
- Badania specjalistyczne

Klirens kreatyniny

Jednym z markerów wydolności nerek jest kreatynina. Na podstawie kreatyniny liczymy klirens kreatyniny. Jest to parametr szacujący filtrację kłębuszkową (GFR).

Wzór na klirens kreatyniny wg Schwartza

$$\text{eGFR [ml/min/1,73m}^2\text{]} = 0,413 \frac{\text{wzrost [cm]}}{\text{kreatynina [mg/dl]}}$$

Badanie ogólne moczu

Przejrzystość	przejrzysty
Barwa moczu	żółty
Glukoza	ujemny [mg/dl]
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	ujemny [mg/dl]
Ciężar właściwy	1.025 (1.015-1.025)
pH	6.0 (5.0-7.5)
Białko	ujemny [mg/dl]
Urobilinogen	1.0 (0.2-1.0) [E.U./dl]
Azotyny	ujemny
Krew	ujemny
Leukocyty	ujemny

Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu

NABŁONKI PŁASKIE:

pojedyncze w preparacie

KRWINKI BIAŁE:

pojedyncze w preparacie

KRWINKI CZERWONE ŚWIEŻE:

pojedyncze w preparacie

**Prawidłowy wynik badania
ogólnego moczu**

Białkomocz

- Fizjologicznie utrata do 150 mg/m²/24h
- Białkomocz stwierdza się u 5-15% dzieci w wieku szkolnym



Przemijający (czynnościowy)

- Gorączka
- Wysięk fizyczny
- Drgawki
- Przegrzanie/oziębienie

Ortostatyczny

- Występuje po pionizacji
- Nie powoduje pogorszenia funkcji nerek

Stały


- 0,1% dzieci
- Zwykle świadczy o chorobie nerek
- Wymaga diagnostyki

Krwinkomocz

>5 **erytrocytów** w polu widzenia

Krwinkomocz:

- mikroskopowy – erytrocyty widoczne tylko pod mikroskopem
- makroskopowy – zmiana zabarwienia moczu (=krwiomocz)



Leukocyturia

- **> 5 leukocytów** w polu widzenia w moczu nieodwirowanym
- **≥ 10 leukocytów** w polu widzenia w moczu odwirowanym
- Liczba leukocytów **powyżej wartości referencyjnej** w badaniu w mikroskopii automatycznej lub cytometrze przepływowym

Leukocyturia (ropomocz) – podstawowy objaw zakażenia układu moczowego.

Pacjent nr 1

Matka zgłosiła się do pediatri z 5-letnią córką z powodu **obrzęków twarzy dziecka**, które według niej narastają od 2 tygodni. Tydzień wcześniej dziecko było badane przez lekarza, rozpoznano alergię i zalecono leki antyhistaminowe. Matkę martwi brak efektu leczenia, dodatkowo zgłasza, że obecnie nie jest w stanie dopiąć butów na nogach córki ani zapiąć jej spodni.

Przejrzystość	przejrzysty
Barwa moczu	żółty
Glukoza	ujemny
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	ujemny
Ciężar właściwy	1.025
pH	7.0
Białko	1121 [mg/dl]
Urobilinogen	0.2
Azotyny	ujemny
Krew	śląd
Leukocyty	ujemny

Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu

NABŁONKI PŁASKIE:	pojedyncze w preparacie
KRWINKI BIAŁE:	pojedyncze w preparacie
KRWINKI CZERWONE ŚWIEŻE:	pojedyncze w preparacie

Przejrzystość	przejrzysty
Barwa moczu	żółty
Glukoza	ujemny
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	ujemny
Ciężar właściwy	1.025
pH	7.0
Białko	1121 [mg/dl]
Urobilinogen	0.2
Azotyny	ujemny
Krew	śląd
Leukocyty	ujemny

Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu

NABŁONKI PŁASKIE:	pojedyncze w preparacie
KRWINKI BIAŁE:	pojedyncze w preparacie
KRWINKI CZERWONE ŚWIEŻE:	pojedyncze w preparacie

Zespół nerczycowy (ZN)

- Utrata białka z moczem w ilości przekraczającej możliwości kompensacyjne ustroju. Zwiększone wydalenie białka z moczem spowodowane jest **wzmożoną przepuszczalnością błony filtracyjnej kłębuszków nerkowych**.
- Na ZN składają się następujące odchylenia:
 - Białkomocz nerczycowy, czyli utrata białka z moczem w ilości **>50 mg/kg/dobę** lub **wskaźnik białko/kreatynina w moczu ≥ 2** lub **białko >3+ w teście paskowym**
 - Hipoalbuminemia (obniżenie stężenia albumin w surowicy **< 3 g/dl**) lub obecność obrzęków
 - Zwykle towarzyszy hiperlipidemia

Zespół nerczycowy (ZN)

- Idiopatyczny zespół nerczycowy (na podłożu zmiany minimalnej) stanowi 90% przypadków ZN u dzieci między 1. i 10. rż. i 50% po 10. rż.
- U większości dzieci z ZN na podłożu nefropatii submikroskopowej leczenie steroidami pozwala na uzyskanie remisji choroby (ZN steroidowrażliwy).
- **Pacjent z podejrzeniem zespołu nerczycowego powinien zostać skierowany do szpitala!**

Pacjent nr 2

Matka zgłosiła się do pediatry z 5-letnim chłopcem z powodu osłabienia i spadku apetytu od 3 dni. Dodatkowo zauważyła, że mocz dziecka ma brunatny kolor („kolor Coca-coli”). Podaje, że 2 tygodnie temu dziecko miało infekcję gardła, ale po kilku dniach chorowania wróciło do zwykłej aktywności. Z odchyień w badaniu fizykalnym lekarz stwierdził obrzęki wokół oczu. Parametry zmierzone podczas wizyty:

- RR: 120/80 mmHg
- HR: 100/min
- Temperatura ciała: 37,8 stopni C.

Blood Pressure Levels for Girls by Age and Height Percentile*

Age (Year)	BP Percentile ↓	Systolic BP (mmHg)							Diastolic BP (mmHg)						
		← Percentile of Height →							← Percentile of Height →						
		5th	10th	25th	50th	75th	90th	95th	5th	10th	25th	50th	75th	90th	95th
1	50th	83	84	85	86	88	89	90	38	39	39	40	41	41	42
	90th	97	97	98	100	101	102	103	52	53	53	54	55	55	56
	95th	100	101	102	104	105	106	107	56	57	57	58	59	59	60
	99th	108	108	109	111	112	113	114	64	64	65	65	66	67	67
2	50th	85	85	87	88	89	91	91	43	44	44	45	46	46	47
	90th	98	99	100	101	103	104	105	57	58	58	59	60	61	61
	95th	102	103	104	105	107	108	109	61	62	62	63	64	65	65
	99th	109	110	111	112	114	115	116	69	69	70	70	71	72	72
3	50th	86	87	88	89	91	92	93	47	48	48	49	50	50	51
	90th	100	100	102	103	104	106	106	61	62	62	63	64	64	65
	95th	104	104	105	107	108	109	110	65	66	66	67	68	68	69
	99th	111	111	113	114	115	116	117	73	73	74	74	75	76	76
4	50th	88	88	90	91	92	94	94	50	50	51	52	52	53	54
	90th	101	102	103	104	106	107	108	64	64	65	66	67	67	68
	95th	105	106	107	108	110	111	112	68	68	69	70	71	71	72
	99th	112	113	114	115	117	118	119	76	76	76	77	78	79	79
5	50th	89	90	91	93	94	95	96	52	53	53	54	55	55	56
	90th	103	103	105	106	107	109	109	66	67	67	68	69	69	70
	95th	107	107	108	110	111	112	113	70	71	71	72	73	73	74
	99th	114	114	116	117	118	120	120	78	78	79	79	80	81	81
6	50th	91	92	93	94	96	97	98	54	54	55	56	56	57	58
	90th	104	105	106	108	109	110	111	68	68	69	70	70	71	72
	95th	108	109	110	111	113	114	115	72	72	73	74	74	75	76
	99th	115	116	117	119	120	121	122	80	80	80	81	82	83	83
7	50th	93	93	95	96	97	99	99	55	56	56	57	58	58	59
	90th	106	107	108	109	111	112	113	69	70	70	71	72	72	73
	95th	110	111	112	113	115	116	116	73	74	74	75	76	76	77
	99th	117	118	119	120	122	123	124	81	81	82	82	83	84	84
8	50th	95	95	96	98	99	100	101	57	57	57	58	59	60	60
	90th	108	109	110	111	113	114	114	71	71	71	72	73	74	74
	95th	112	112	114	115	116	118	118	75	75	75	76	77	78	78
	99th	119	120	121	122	123	125	125	82	82	83	83	84	85	86
9	50th	96	97	98	100	101	102	103	58	58	58	59	60	61	61
	90th	110	110	112	113	114	116	116	72	72	72	73	74	75	75
	95th	114	114	115	117	118	119	120	76	76	76	77	78	79	79
	99th	121	121	123	124	125	127	127	83	83	84	84	85	86	87
10	50th	98	99	100	102	103	104	105	59	59	59	60	61	62	62
	90th	112	112	114	115	116	118	118	73	73	73	74	75	76	76
	95th	116	116	117	119	120	121	122	77	77	77	78	79	80	80
	99th	123	123	125	126	127	129	129	84	84	85	86	86	87	88

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się u dziecka, u którego wartość BP skurczowego i/lub rozkurczowego wynosi $\geq 95.$ **centyla dla wieku, płci i centyla wzrostu**, uzyskanego z pomiarów wykonanych podczas 3 niezależnych wizyt.

Przejrzystość	przejrzysty
Barwa moczu	brunatny
Glukoza	ujemny
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	śląd
Ciężar właściwy	1.025
pH	6.0
Białko	44 [mg/dl]
Urobilinogen	1.0
Azotyny	ujemny
Krew	dużo
Leukocyty	mało

Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu

NABŁONKI PŁASKIE:	pojedyncze w polu widzenia
KRWINKI BIAŁE:	od 2 do 3 w polu widzenia
KRWINKI CZERWONE ŚWIEŻE I CZĘŚCIOWO WYŁUGOWANE:	od 60 do 70 w polu widzenia
OBECNE:	bakterie pojedyncze
OBECNE:	wałeczki erytrocytarne i wałeczki szklisto-ziarniste

Przejrzystość	przejrzysty
Barwa moczu	brunatny
Glukoza	ujemny
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	śląd
Ciężar właściwy	1.025
pH	6.0
Białko	44 [mg/dl]
Urobilinogen	1.0
Azotyny	ujemny
Krew	dużo
Leukocyty	mało
Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu	
NABŁONKI PŁASKIE:	pojedyncze w polu widzenia
KRWINKI BIAŁE:	od 2 do 3 w polu widzenia
KRWINKI CZERWONE ŚWIEŻE I CZĘŚCIOWO WYŁUGOWANE:	od 60 do 70 w polu widzenia
OBECNE:	bakterie pojedyncze
OBECNE:	wałeczki erytrocytarne i wałeczki szklisto-ziarniste

Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek

- Rozwija się nagle, najczęściej po 1-3 tygodniach od przebycia paciorkowcowego zapalenia gardła lub 2-3 tygodnie po pojawieniu się zmian skórnych o etiologii paciorkowcowej (paciorkowiec beta-hemolizujący grupy A – *Streptococcus pyogenes*). Chorobę mogą też wywołać inne patogeny (rzadziej).
- Podstawowe objawy kliniczne składają się na tzw. **triadę Addisa**: obrzęki, nadciśnienie tętnicze oraz zmiany w moczu (krwinkomocz i wałeczki erytrocytowe).
- Może wystąpić ostre uszkodzenie nerek, które w większości przypadków ustępuje. Niewielka liczba pacjentów wymaga leczenia nerkozastępczego.
- Najczęstsza przyczyna **zespołu nefrytycznego** u dzieci.

Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek

- Zmiany w badaniu ogólnym moczu:
 - krwinkomocz
 - u ok. 30% chorych krwimocz
 - białkomocz
 - wałeczkomocz (wałeczki erytrocytarne, szklisto-ziarniste i ziarniste)
 - w mikroskopie kontrastowo-fazowym stwierdza się erytrocyty dysmorficzne oraz akantocyty.
- Rokowanie: dobre. W większości przypadków dochodzi do całkowitego ustąpienia choroby. Czasem niewielki krwinkomocz i białkomocz mogą utrzymywać się po wyzdrowieniu przez kilka tygodni lub miesięcy.

Pacjent nr 3

Matka zgłosiła się do lekarza z 2-miesięczną dziewczynką z powodu gorączki do 39 st C co około 6-8 godzin, spadku apetytu i rozdrażnienia obserwowanych u córki od 2 dni, wg matki dziecko jest mniej aktywne. W wywiadzie: dziecko z CII PI w 36. tygodniu ciąży, masa urodzeniowa 2700 g, otrzymało 9 pkt w skali Apgar. Szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono: podsychające śluzówki, tachykardię 170/min, dziecko było niespokojne.

Zlecono badania laboratoryjne z krwi, z odchyleń: CRP: 8 mg/dl (norma: <0,5 mg/dl), w morfologii leukocytoza 18 tys/uL.

Przejrzystość	mętny
Barwa moczu	żółty
Glukoza	ujemny
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	ujemny
Ciężar właściwy	1.025
pH	6.5
Białko	śląd
Urobilinogen	0.2
Azotyny	dodatni
Krew	śląd
Leukocyty	dużo

Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu

NABŁONKI PŁASKIE:	pojedyncze w polu widzenia
KRWINKI BIAŁE:	od 35 do 45 wpw i w skupiskach po kilka leukocytów
KRWINKI CZERWONE:	od 2 do 4 w polu widzenia

Przejrzystość**Barwa moczu****Glukoza****Bilirubina****Ciała ketonowe****Ciężar właściwy****pH****Białko****Urobilinogen****Azotyny****Krew****Leukocyty****Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu****NABŁONKI PŁASKIE:****KRWINKI BIAŁE:****KRWINKI CZERWONE:****mętny****żółty****ujemny****ujemny****ujemny****1.025****6.5****śląd****0.2****dodatni****śląd****dużo****pojedyncze w polu widzenia****od 35 do 45 wpw i w skupiskach po kilka leukocytów****od 2 do 4 w polu widzenia**

Zakażenie układu moczowego (ZUM)

- Objawy są niespecyficzne!
- **U wszystkich dzieci do 5. roku życia gorączkujących bez uchwytnej przyczyny należy podejrzewać ZUM i wykonać badania moczu (badanie ogólne + posiew moczu)**
- Nierozpoznana infekcja układu moczowego u najmłodszych dzieci niesie ryzyko jej uogólnienia. Ponadto opóźnienie lub brak rozpoznania i podjęcia odpowiedniego leczenia stwarza niebezpieczeństwo powstania blizn pozapalnych w miąższu nerkowym

Objawy ZUM w zależności od wieku dziecka

Wiek dziecka	Objawy sugerujące ZUM
Niemowlęta 2.–12. miesiąc życia	Gorączka, niechęć do jedzenia, wymioty, brak przyrostu masy ciała, niepokój i płacz podczas mikcji, nadmierna senność, zmiana barwy, przejrzystości i zapachu moczu
Dzieci 2.–6. rok życia	Gorączka, wymioty, biegunka, brak łaknienia, brak przyrostu masy ciała, bóle brzucha, nadmierna senność, drażliwość, zaburzenia oddawania moczu, objawy dyzuryczne , zmiana barwy, przejrzystości i zapachu moczu
Dzieci > 6. roku życia	Gorączka, nudności i wymioty, bóle brzucha, bóle okolicy lędźwiowej , złe samopoczucie, objawy dyzuryczne, zaburzenia oddawania moczu, zmiana barwy, przejrzystości i zapachu moczu

Czynniki ryzyka ZUM

- ZUM w wywiadzie
- Obecność rozpoznanej wady wrodzonej układu moczowego, w tym odpływ pęcherzowo-moczowodowy (OPM)
- Nieprawidłowe wyniki badań ultrasonograficznych (USG) w wywiadzie
- Dodatni wywiad rodzinny w kierunku ZUM (rodzice, rodzeństwo)
- Dodatni wywiad rodzinny w kierunku wad wrodzonych układu moczowego
- Cewnikowanie pęcherza
- Zaburzenia mikcji (nietrzymanie moczu, częste lub rzadkie mikcje, parcia naglące)
- Zaparcia, nietrzymanie stolca
- Aktywność seksualna dziewcząt
- Niewłaściwa higiena okolicy ujścia cewki moczowej

Rozpoznanie ZUM

Podstawowym badaniem potwierdzającym ZUM jest **badanie mikrobiologiczne moczu**. W badaniu ogólnym >10 leukocytów w polu widzenia zwiększa prawdopodobieństwo rozpoznania.

Znamienna bakteriuria – wartość zależy od metody pobrania moczu:

- ze środkowego strumienia $\geq 10^5$ CFU/ml
- drogą cewnikowania $\geq 10^4$ CFU/ml
- drogą nakłucia nadłonowego $\geq 10^3$ CFU/ml

Pobranie moczu

- Na badanie mikrobiologiczne: metodą czystego pobrania moczu ze środkowego strumienia lub cewnikowania pęcherza moczowego lub nakłucia nadłonowego.

Niedopuszczalne jest pobranie moczu na posiew z woreczka podklejonego w okolicy krocza.

- Na badanie ogólne dowolną metodą z powyższych

Posiew moczu należy pobrać u każdego dziecka z podejrzeniem ZUM **przed** włączeniem leczenia.



Definicje

Zakażenie dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego)

Stan zapalny pęcherza charakteryzujący się wystąpieniem objawów dyzurycznych, częstymi mikcjami, parciem nagłym, moczeniem, bólem w okolicy nadłonowej, nieprzyjemnym zapachem moczu, niekiedy krwimoczem.

Zakażenie górnych dróg moczowych (ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre infekcyjne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek)

Bakteryjne zakażenie obejmujące miedniczkę nerkową i śródmiąższ nerki, charakteryzujące się zazwyczaj **ostрым początkiem, temperaturą ciała $>38^{\circ}\text{C}$, bólem brzucha lub tkliwością w okolicy lędźwiowej** (dodatni objaw Goldflama) + mogą wystąpić objawy z dolnych dróg moczowych opisane powyżej.

U dzieci w wieku poniżej 24. miesiąca życia często występują trudności w ustaleniu lokalizacji zakażenia.

Definicje – cd.

Bezobjawowa bakteriuria

Obecność w moczu szczepu bakterii w istotnym mianie, który nie wywołuje odpowiedzi zapalnej układu moczowego.

Kogo leczymy?

- dzieci przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi układu moczowego - podanie 2 dawek celowanego antybiotyku: przed i po procedurze.
- nastolatki w ciąży

Pacjent nr 4

Matka zgłosiła się z 4-letnim chłopcem do pediatri z powodu wysypki na kończynach dolnych, która pojawiła się tego dnia rano. W relacji matki wysypka rozprzestrzeniła się w kolejnych godzinach na pośladki, dołączył się ból stawów kolanowych. W badaniu przedmiotowym lekarz stwierdził czerwone wybroczyny na kończynach dolnych i pośladkach uniesione ponad poziom zdrowej skóry oraz obrzęk stawów kolanowych. Stan dziecka dobry.

Badanie ogólne moczu

Przejrzystość	przejrzysty
Barwa moczu	żółty
Glukoza	ujemny
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	ujemny
Ciężar właściwy	1.025
pH	6.0
Białko	ujemny
Urobilinogen	1.0
Azotyny	ujemny
Krew	ujemny
Leukocyty	ujemny

Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu

NABŁONKI PŁASKIE:

pojedyncze w preparacie

KRWINKI BIAŁE:

pojedyncze w preparacie

KRWINKI CZERWONE ŚWIEŻE:

pojedyncze w preparacie

Zapalenie naczyń związane z IgA

- Zapalenie naczyń, w którym w małych naczyniach (głównie włosniczkach, żyłkach i tętniczkach) stwierdza się złogi immunologiczne, głównie IgA1.
- Choroba ma ostry początek. W ok. 50% przypadków występuje po 1–2 tygodniach od wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych, czasem po zakażeniu przewodu pokarmowego.
- Objawy:
 - **skóra:** osutka plamista lub pokrzywka, przechodząca w plamicę uniesioną, umiejscowione zwykle na kończynach dolnych i pośladkach; zmiany pojawiają się jednorazowo lub nawracają rzutami wraz z innymi objawami
 - **stawy:** ból stawów, głównie kończyn dolnych (kolanowych i skokowych), czasem z innymi objawami zapalenia stawów
 - **przewód pokarmowy:** ból brzucha, zwykle rozlany, nasila się po jedzeniu, związany z zapaleniem naczyń jelit (najczęściej jelita cienkiego), niekiedy krwista biegunka
 - **nerki:** najczęściej krwimocz

Zapalenie naczyń związane z IgA

- Badanie ogólne moczu w większości przypadków jest początkowo prawidłowe. Objawy wynikające z zajęcia naczyń nerek występują u 20–30% chorych dzieci.
- Nieobecność zmian w badaniu ogólnym moczu nie wyklucza rozpoznania
- Obowiązuje regularna kontrola badania ogólnego moczu po zachorowaniu – objawy ze strony nerek mogą wystąpić z opóźnieniem
- Rokowanie: dobre

Pacjent nr 5

Matka zgłosiła się do pediatry z 7-letnim synem. Zgłasza, że odkąd pamięta dziecko bezwiednie oddaje mocz w nocy, zdarza się to około 3-4 razy w ciągu tygodnia, czasami dwukrotnie tej samej nocy. Dziecko nie moczy się w ciągu dnia, nie miało do tej pory zakażenia układu moczowego, rozwój prawidłowy. W badaniu przedmiotowym bez odchyleń. W badaniach laboratoryjnych z krwi bez istotnych odchyleń.

Badanie ogólne moczu

Przejrzystość	przejrzysty
Barwa moczu	żółty
Glukoza	ujemny
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	ujemny
Ciężar właściwy	1.001
pH	6.0
Białko	ujemny
Urobilinogen	1.0
Azotyny	ujemny
Krew	ujemny
Leukocyty	ujemny

Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu

NABŁONKI PŁASKIE:

pojedyncze w preparacie

KRWINKI BIAŁE:

pojedyncze w preparacie

KRWINKI CZERWONE ŚWIEŻE:

pojedyncze w preparacie

Badanie ogólne moczu

Przejrzystość	przejrzysty
Barwa moczu	żółty
Glukoza	ujemny
Bilirubina	ujemny
Ciała ketonowe	ujemny
Ciężar właściwy	1.001 (norma: 1.015-1.025)
pH	6.0
Białko	ujemny
Urobilinogen	1.0
Azotyny	ujemny
Krew	ujemny
Leukocyty	ujemny

Ocena mikroskopowa komórek osadu moczu

NABŁONKI PŁASKIE:

pojedyncze w preparacie

KRWINKI BIAŁE:

pojedyncze w preparacie

KRWINKI CZERWONE ŚWIEŻE:

pojedyncze w preparacie

Moczenie nocne

- Moczenie nocne to bezwiedne oddawanie moczu w nocy, podczas snu, zdarzające się u dziecka, które **zakończyło już trening czystości** (naukę świadomego oddawania moczu) lub **ukończyło 5 lat**.
- Moczenie nocne dotyczy około 5-15% populacji 6-7 latków. Częstość występowania moczenia zmniejsza się z wiekiem.

Moczenie nocne

Typ moczenia nocnego

- **monosymptomatyczne** – moczenie nocne, któremu nie towarzyszą inne objawy ze strony dolnych dróg moczowych (ok. 80% dzieci moczących się w nocy)
- **niemonosymptomatyczne** - moczenie nocne, któremu towarzyszą inne objawy ze strony dolnych dróg moczowych, np. nietrzymanie moczu w ciągu dnia, ZUM, parcia naglące (ok. 20% dzieci moczących się w nocy)

Rodzaj moczenia nocnego

- **pierwotne** – moczenie nocne, w trakcie którego nie wystąpił 6 miesięczny okres suchych nocy
- **wtórne** – moczenie nocne, przed którym wystąpił okres suchych nocy przekraczający 6 miesięcy

Moczenie nocne

W patogenezie monosymptomatycznego moczenia nocnego wyróżnia się 2 mechanizmy:

- poliuria nocna: wzmożone wydzielanie moczu w nocy, spowodowane niedoborem wazopresyny
- nocna nadczynność wypieracza pęcherza: niepohamowane skurcze pęcherza w ciągu nocy, powodujące zmniejszenie oczekiwanej objętości pęcherza moczowego.

Moczenie nocne

Leczenie (monosymptomatyczne moczenie nocne)

- I etap: edukacja, postępowanie wspomagające i motywujące (m.in. zmiana nawyków, reżim płynowy, prowadzenie kalendarza moczenia nocnego)
- II etap: desmopresyna lub alarm wybudzeniowy

Jeśli brak efektu → skierowanie do ośrodka specjalistycznego

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej – zakładka „Zalecenia”